

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-7-67 673201

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

ABONNEMENT ANNUEL

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES) MEUSE

25 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
67 STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

12 juillet 1967

Supplément n° 1 au bulletin du mois de juillet 1967.

/Avertissement/

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

CARPOCAPSE

Les derniers papillons de première génération étant encore en activité, il apparaît nécessaire de conseiller le renouvellement de la protection insecticide des fruits. On opérera dès réception du présent avis.

Sur les variétés à maturité précoce (Transparente blanche par exemple), on tiendra compte des limitations d'emploi de certains produits (prescriptions légales communiquées antérieurement).

/Avertissement/

POMMES DE TERRE - (Toutes régions) -

MILDIOU

L'état sanitaire des cultures reste satisfaisant. Toutefois quelques nouvelles taches consécutives aux pluies du 30 juin sont récemment apparues.

Dans les cultures de variétés sensibles, à arracher ou à défaner après le 22 juillet il est conseillé de renouveler la protection avant le 17 juillet.

On pourra éventuellement profiter de cette application pour intervenir contre le Doryphore en application mixte. Si des phénomènes de résistance aux insecticides chlorés étaient constatés il serait prudent de porter son choix sur un produit d'un autre groupe (Type Azinphos, Carbaryl etc...)

/Avertissement/

M A I S

PYRALE DU MAIS

Si ce parasite est présent dans la plupart des zones de cultures de notre circonscription, les dégâts qu'il cause sont généralement très inégaux d'une région à l'autre.

375

C'est dans la plaine de la Hardt (secteur d'Algosheim - Neuf-Brisach), que les papillons manifestent, cette année encore, le plus d'activité. Les sorties ont débuté vers le 25 Juin, et des pontes sont observées en culture. Dans les situations les plus exposées un traitement devra être réalisé, lorsque 50 % des panicules mâles seront visibles dans le cornet (avant que la panicule mâle ne soit complètement dégagée). On emploiera un insecticide à base de D.D.T. ou d'Heptachlore sous forme granuleuse. La dose à épandre est de 20 à 30 kg de granulés à l'hectare.

- Dans la région du Kochersberg, où l'activité de la Pyrale est relativement faible cette année, on limitera les traitements aux champs situés dans les zones les plus contaminées les années antérieures.

- Dans le secteur de Wissembourg l'exécution de ce traitement devra être différée jusqu'à nouvel avis.

- Dans le Sundgau et plus spécialement le secteur d'Altkirch, ce traitement insecticide ne paraît pas nécessaire.

Information

FRAISIERS.

OTIORRHYNQUES

On observe actuellement dans certaines cultures de Fraisiers notamment dans la région du TOULOIS (54) des dégâts assez caractérisés d'OTIORRHYNQUES.

Afin d'enrayer le développement de ces attaques, on pourra exécuter avantageusement un traitement insecticide à base d'un des produits suivants :

Diéldrine à 8 gr de Matière Active/are.

Lindane à 4,8 gr de Matière Active/are.

Parathion à 4 gr de Matière Active/are.

On opérera aussitôt après la récolte.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.